



Informe de Abundancia de Larvas de Mexillón

DATA: 07/10/11

INFORME Nº: 2011/41

COMENTARIOS

Ría de Ares-Betanzos

- Niveis baixos de larvas en “D” nas estacións (L1, L2, L4)
- Niveis medio-baixos de larvas con “ollo” na estación L4, e medios na L1 e L2

Ría de Muros-Noia

- Niveis baixos de larvas en “D” nas dúas estacións (M1, M5)
- Niveis medio-baixos de larvas con “ollo” na estación M1 e medios na M5

Ría de Arousa

- Niveis baixos de larvas en “D” na estación A9, e medio-baixos na A4 e A6
- Niveis baixos de larvas con “ollo” nas tres estacións (A6, A4, A9)

Ría de Pontevedra

- Niveis medio-baixos de larvas en “D” na estación P2, e medios na P3
- Niveis medios de larvas con “ollo” nas dúas estacións (P2, P3)

Ría de Vigo

- Niveis baixos de larvas en “D” na estación V3, medio-baixos na V2 e medios na V1
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación V2, medio-baixos na V3 e medios na V1

OBSERVACIÓNS:

Ascenso de larvas en “D” na Ría de Pontevedra e descenso nas restantes rías.

Ascenso de larvas con “ollo” nas Rías Baixas excepto na Ría de Arousa onde se observa un descenso destas larvas. Sen cambios significativos na Ría de Ares-Betanzos.

Fixacións inminentes na Ría de Ares-Betanzos e nas Rías Baixas con probabilidade de continuar durante as vindeiras dúas semanas. Probabilidade de novas fixacións no prazo de 3 a 5 semanas.



