



Informe de Abundancia de Larvas de Mexillón

DATA: 21/10/11

INFORME Nº: 2011/43

COMENTARIOS

Ría de Ares-Betanzos

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (L1, L2, L4)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación L1, e medio-baixos na L2 e L4

Ría de Muros-Noia

- Niveis baixos de larvas en “D” na estación M1, e medio-baixos na M5
- Niveis medio-baixos de larvas con “ollo” na estación M5 e medios na M1

Ría de Arousa

- Niveis baixos de larvas en “D” na estación A6, medio-baixos na A4, e medios na A9
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación A6, e medio-baixos na A4 e A9

Ría de Pontevedra

- Niveis baixos de larvas en “D” na estación P3, e medio-baixos na P2
- Niveis medios de larvas con “ollo” nas dúas estacións (P2, P3)

Ría de Vigo

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (V1, V2, V3)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación V3, medio-baixos na V2 e medios na V1

OBSERVACIÓNS:

Aumento de larvas en D na Ría de Arousa e sen cambios significativos nas restantes rías.
Ascenso de larvas con “ollo” nas Rías de Vigo e Pontevedra, sen cambios significativos na Ría de Muros-Noia e descenso nas rías de Arousa e Ares-Betanzos.
Fixacións inminentes en tódalas rías con probabilidade de continuar durante as vindeiras 3 semanas.



